

Приготовление и дозирование суспензии препарата Тамиколд из капсул 75 мг

Вам понадобится:



1 капсула
Тамиколд 75 мг



Острые
ножницы



2 чашки



2 шприца
(большой
и маленький)



1 чайная
ложка




Вода



Сладкий
сироп


Шаг 1. Высыпать весь порошок в чашку

Держите капсулу над чашкой и аккуратно отрежьте верхушку капсулы ножницами. Высыпьте весь порошок в чашку.




Шаг 2. Добавить воду к порошку

Наберите в большой шприц 12,5 мл воды. Добавьте ее к порошку в чашке. Размешивайте раствор чайной ложкой примерно 2 мин.



Шаг 3. Определить правильную дозу

Наберите маленьким шприцем необходимое количество суспензии, соответствующее весу ребенка (см. табл.) и перелейте в другую чашку.



Дети в возрасте 1 года и старше с массой тела менее 40 кг


Масса тела ребенка (примерная)	Количество суспензии, которое необходимо отобрать
До 15 кг	5,0 мл
от 15 до 23 кг	7,5 мл
от 23 до 40 кг	10,0 мл

Младенцы младше 1 года (включая доношенных новорожденных)

Масса тела ребенка (примерная)	Количество суспензии, которое необходимо отобрать
3 кг	1,5 мл
3,5 кг	1,8 мл
4 кг	2,0 мл
4,5 кг	2,3 мл
5 кг	2,5 мл
5,5 кг	2,8 мл
6 кг	3,0 мл
6,5 кг	3,3 мл
7 кг	3,5 мл
7,5 кг	3,8 мл
8 кг	4,0 мл
8,5 кг	4,3 мл
9 кг	4,5 мл
9,5 кг	4,8 мл
10 кг или более	5,0 мл

Шаг 4. Подсластить суспензию и дать ее ребенку

Добавьте небольшое количество сиропа (не более 1 чайной ложки) для маскировки горького вкуса порошка из капсулы Тамиколд во вторую чашку. Дайте содержимое второй чашки ребенку.



Шаг 5. Выбросить неиспользованные остатки

Выбросьте неиспользованные остатки суспензии препарата Тамиколд из первой чашки, так как они не подлежат хранению.

Тамиколд от гриппа защитит и победит!